健康署第一次兒童衛教指導檢查紀錄結果表單 (出生至二個月)

※紅框內之欄位請醫護人員協助家長於衛教指導前先行填寫,以供醫師參考。

【本檢查「由衛生福利部國民健康署運用菸品健康福利捐補助」】

姓名		出生日期	年 月 日 身分證字號
衛教主題	重點	家長評估 未 已 做 0 到 到	醫師指導重點
1.嬰兒哺餵	餵食 狀況		觀察寶寶一天尿褲變濕五至八次來確定寶寶有吃飽。 餵奶問題之原因與處理,尤其是母乳哺餵問題。 寶寶餵食後一小時內,應注意溢吐奶狀況。
2.口腔清潔	口腔 清潔		使用紗布清潔口腔(包含舌頭)。
3.嬰兒延長性黃疸	黄疸 狀況		以嬰兒大便卡觀察比對寶寶大便顏色。 寶寶出生後三十天仍有黃疸或大便顏色不正常,要帶回 院所檢驗。
4.預防事故傷害及嬰兒猝死	寶寶睡姿		每次睡眠都應仰睡,可考慮在睡眠時使用奶嘴。
	睡眠環境		睡眠地方(床鋪)表面須堅實。 與嬰兒同室但避免同床(含沙發或墊子)。 嬰兒床避免有鬆軟物件或防撞護墊(床圍)。 一歲以下禁止使用枕頭(即使中間有凹/洞設計的也不行) 若使用拉起式嬰兒床欄,應注意欄杆墜落、造成寶寶夾 傷或窒息,且床欄杆兼具不可以超過六公分。
	家人行為		保持無菸環境,避免寶寶受二手菸、三手菸的危害。 照顧寶寶時避免服用會影響清醒能力的藥物或酒精性飲料。
	嬰兒 搖晃症		寶寶哭泣是和大人的溝通方式,需要家長耐心安撫,不可以劇烈搖晃、旋轉或將寶寶重摔床上;如果照顧者情 緒無法控制,請向親友或專業人士尋求協助。
	安全照顧行為		寶寶身上或身邊勿有任何懸線,如懸掛奶嘴、項鍊、平 安符、窗簾繩或玩具吊繩。 不要抱著寶寶泡牛奶或拿著熱飲。 準備寶寶洗澡水,先放冷水再放熱水。
	寶寶外出		乘車應使用嬰兒用後向式安全座椅,置於汽車後座且面 向後方。 避免使用機車或自行車搭載寶寶。
※返家後若有育兒需求諮詢,請多加運用孕產婦關懷專線 0800-870870			
醫療院所名稱及代碼 衛		新 教指導對象	與寶寶關係 醫師簽章
			指導日期 年 月 日

備註:一、本衛教指導內容由健康署及臺灣兒科醫學會共同研擬。

- 二、本次衛教指導請參閱兒童健康手冊內容予以衛教。
- 三、本表資料將會作為衛生單位政策評估或個案追蹤健康管理時使用。