

動物用藥品使用準則第四條附件二 含藥物飼料添加物使用規範修正規定

一、成分規格：

- (一) 抗生素製品，其抗生素總含量（力價）不得超過百分之二十二。
- (二) 非抗生素製品，其有效成分總含量不得超過百分之二十五。

二、品目：

(一) 抗菌劑類：

- 1.1 安痢黴素Apramycin
- 1.2 阿美拉黴素Avilamycin
- 1.3 培可黴素Bicozamycin
- 1.4 恩黴素Enramycin
- 1.5 富樂黴素Flavomycin (Bambermycin)
- 1.6 六肽黴素Nosipeptide
- 1.7 磺胺二甲嘧啶Sulfamethazine
- 1.8 泰妙素Tiamulin
- 1.9 泰黴素Tylosin

(二) 抗寄生蟲劑類：

- 2.1 安保寧Amprolium
- 2.2 氯吡啶Clopidol
- 2.3 賽滅淨Cyromazine
- 2.4 滴克奎諾Decoquinate
- 2.5 戴克拉爾Diclazuril
- 2.6 衣索巴Ethopabate

- 2.7 拉薩羅Lasalocid
- 2.8 馬杜拉黴素Maduramicin
- 2.9 孟寧素Monensin
- 2.10 那寧素Narasin
- 2.11 乃卡巴精Nicarbazin
- 2.12 歐美德普Ormethoprim
- 2.13 沙利黴素Salinomycin
- 2.14 仙杜拉素Semduramicin
- 2.15 磺胺二甲氧嘧啶Sulfadimethoxine
- 2.16 磺胺奎林Sulfaquinoxaline
- 2.17 柔林Zoalene

三、使用對象、用途、用法、用量、停藥期及使用上應注意事項如下：

1. 抗菌劑類

本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗寄生蟲劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。

1.1 安痢黴素 Apramycin

化學名：Apramycin sulfate

注意事項：連續使用不可超過 14 日。

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
1.1.1 豬	1.1.1.1 安痢黴素	166	體重 30kg 以下使用，預防控制大腸桿菌症，停藥期 28 日。

1.2 阿美拉黴素 Avilamycin

化學名：Avilamycin

注意事項：

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
1.2.1 肉雞	1.2.1.1 阿美拉黴	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率。

素

1.2.2 豬	1.2.2.1 阿美拉黴素	20-40	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。
	1.2.2.2 阿美拉黴素	10-20	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進飼料利用效率。

1.3 培可黴素 Bicozamycin

化 學 名：Bicozamycin

注意事項：蛋雞不可使用。

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
1.3.1 雞	1.3.1.1 培可黴素	5-20	促進生長及改進飼料利用效率。
1.3.2 豬	1.3.2.1 培可黴素	5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。

1.4 恩黴素 Enramycin

化 學 名：Enramycin

注意事項：

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
1.4.1 雞（不包括肉 雞）	1.4.1.1 恩黴素	1-10	10 週齡以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。
1.4.2 肉雞	1.4.2.1 恩黴素	1-10	促進生長及改進飼料利用效率。
1.4.3 豬	1.4.3.1 恩黴素	2.5-20	體重 60kg 以下使用，促進生長及改進飼料利用效率。

1.5 富樂黴素 Flavomycin(Bambermycin)

化 學 名：Flavophospholipol 或 Bambermycin

注意事項：

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
1.5.1 肉雞	1.5.1.1 富樂黴素	1-2.2	促進生長及改進飼料利用效率。
1.5.2 豬	1.5.2.1 富樂黴素	2-4.4	與 1.5.1.1 相同。
1.5.3 牛	1.5.3.1 富樂黴素	1-4.4	與 1.5.1.1 相同。

1.6 六肽黴素 Nosilheptide

化 學 名：N-[1-(Aminocarbonyl)ethenyl]-2-[14-ethylidene-9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,24,26,33,35,36-hexadecahydro-3,23-dihydroxy-11-(1-hydroxyethyl-31-methyl-9,12,19,24,33,43-hexaoxo-30,32-imino-8,5:18,15:40,37-trinitrilo-21,36-([2,4]-endo-thiazolomethanimino)-5H,15H,37H-pyrido[3,2- ω][2,11,21,27,31,7,14,17] benzoxatetrathia triazacyclohexatriacontin-2-yl)-4-thiazole-carboxamide

注意事項：

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
1.6.1 雞(不包括肉雞)	1.6.1.1 六肽黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。
1.6.2 肉雞	1.6.2.1 六肽黴素	2.5-10	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。
1.6.3 猪	1.6.3.1 六肽黴素	2.5-20	促進生長及改進飼料利用效率，停藥期 7 日。

1.7 磺胺二甲嘧啶 Sulfamethazine

化 學 名：N¹-(4,6-dimethyl-2-pyrimidyl) sulfanilamide

注意事項：參照泰黴素（1.9.3.5）合併使用，不可單獨使用。

1.8 泰妙素 Tiamulin

化 學 名：14-Desoxy-14-[(2-diethylaminoethyl) mercaptoacetoxy] mutilin hydrogen fumarate

- 注意事項：1. 不可使用於體重超過 114 公斤（250 磅）的豬隻。
 2. 不可與離子型球蟲藥（如 Monensin、Narasin 及 Salinomycin 等）合併使用。
 3. 猪以外動物不可使用。

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
1.8.1 猪	1.8.1.1 泰妙素	11	促進生長及改進飼料利用效率。
	1.8.1.2 泰妙素	22-38.5	控制豬赤痢，停藥期 2 日。

1.9 泰黴素 Tylosin

化 學 名：Tylosin phosphate

注意事項：

使用	飼料添加	用量	用途用法及停藥期
----	------	----	----------

對象		物	(ppm)	
1.9.1	雞	1.9.1.1 泰黴素	4.4-55	促進生長及改進飼料利用效率。
1.9.2	蛋雞	1.9.2.1 泰黴素	22-55	改進飼料利用效率。
1.9.3	豬	1.9.3.1 泰黴素	100-110 44	預防豬赤痢，100-110ppm 連續餵飼 3 週後，改用 44ppm 至出售。
		1.9.3.2 泰黴素	11-22	體重 60kg 以上使用，促進生長及改進 飼料利用效率。
		1.9.3.3 泰黴素	22-44	體重 30-60kg 使用，促進生長及改進 飼料利用效率。
		1.9.3.4 泰黴素	22-110	體重 10-30kg 使用，促進生長及改進 飼料利用效率。
		1.9.3.5 泰黴素 加 礦胺二甲 嘧啶	44-110 44-110 15 日。	體重 60kg 以下使用，預防豬赤痢，控 制細菌性肺炎。在罹患萎縮性鼻炎時 ，維持增重及飼料利用效率。停藥期

2.抗寄生蟲劑類

本類中任何一種或一組飼料添加物，可與抗菌劑類中任何一種或一組飼料添加物合併使用。

2.1 安保寧 Amprolium

化 學 名：1-[4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride hydrochloride

注意事項：安保寧加衣索巴加礦胺奎林在蛋雞及種雞 16 週齡後均不得使用，停藥期 10 日。

使用 對象		飼料添加 物	用 量 (ppm)	用 途 用法及停藥期
2.1.1	肉雞 新母 雞	2.1.1.1 安保寧 2.1.1.2 安保寧 2.1.1.3 安保寧	80-250 40-250 125	預防球蟲病。 預防球蟲病。 預防球蟲病。
2.1.2	雞	2.1.2.1 安保寧 加 衣索巴	125-250 4	預防球蟲病。
2.1.3	雞	2.1.3.1 安保寧 加 衣索巴 加	100 5	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病， 停藥期 10 日。

2.2 氯吡啶 Clopidol

化 學 名：3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol

注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。

使用 對象	飼料添加 物	用 量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.2.1 肉雞 及新 母雞	2.2.1.1 氯吡啶	125-250	預防球蟲病及雞住血原蟲性白冠病， 停藥期 5 日。

2.3 賽滅淨 Cyromazine

化 學 名：N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine

注意事項：肉雞不可使用。

使用 對象	飼料添加 物	用 量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.3.1 蛋雞 及種 雞	2.3.1.1 賽滅淨	5	控制蒼蠅之幼蟲（蛆），連續使用 4-6 週或蒼蠅棲群受到控制為止，蒼蠅棲 群增加時可重複使用。

2.4 滴克奎諾 Decoquinate

化 學 名：Ethyl-6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate

注意事項：蛋雞不可使用，肉雞單獨使用本劑時不需停藥期。

使用 對象	飼料添加 物	用 量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.4.1 肉雞	2.4.1.1 滴克奎諾	30	預防球蟲病。

2.5 戴克拉爾 Diclazuril

化 學 名： $(\pm)2,6\text{-dichloro-}\alpha\text{-(4-chlorophenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl] benzeneacetonitrile}$

注意事項：蛋雞不可使用。

使用 對象	飼料添加 物	用 量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.5.1 肉雞	2.5.1.1 戴克拉爾	1	預防球蟲病，停藥期 5 日

2.6 衣索巴 Ethopabate

化 學 名：Methyl-4-acetamido-2-ethoxybenzoate

注意事項：參照安保寧（2.1.2.1 及 2.1.3.1）及乃卡巴精（2.11.1.2）合併使用，不可

單獨使用。

2.7 拉薩羅 Lasalocid

化 學 名：6-[7-R[5S-Ethyl-5-(5R-ethyltetrahydro-5-hydroxy-6S-methyl-2H-pyran- 2R-yl)tetrahydro-3S-methyl-2S-furanyl]-4S-hydroxy-3R, 5S-dimethyl]-2,3-cresotic sodium salt

注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.7.1 肉雞 或更 新母 雞	2.7.1.1 拉薩羅	75-125	預防球蟲病。

2.8 馬杜拉黴素 Maduramicin

化 學 名：Maduramicin ammonium

注意事項：1. 蛋雞不可使用。

2. 使用於雞以外的動物，可能會引起危險。

3. 本飼料添加物與 Tiamulin 不可同時使用。

使用 對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.8.1 肉雞	2.8.1.1 馬杜拉黴素 加 乃卡巴精	5-7 3.75-4.125 40-44	預防球蟲病，停藥期 5 日。 與 2.8.1.1 相同。

2.9 孟寧素 Monensin

化 學 名：Monensin sodium

注意事項：1. 產蛋中之蛋雞不可使用。

2.16 週齡以上之雞不可使用。

3. 本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。

4. 馬或馬屬動物不可使用。

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.9.1 雞	2.9.1.1 孟寧素	100-120	預防球蟲病。

2.10 那寧素 Narasin

化 學 名：Narasin

- 注意事項：1. 兔子、火雞、產蛋中之蛋雞及馬或馬屬動物不可使用。
 2. 本飼料添加物不可與 Tiamulin 或 Troleandomycin 同時使用。
 3. 那寧素與乃卡巴精合用時必須供應充足的飲水及注意雞舍通風。

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.10.1 雞	2.10.1.1 那寧素	60-80	預防球蟲病。
	2.10.1.2 那寧素 加 乃卡巴精	30-50	預防球蟲病，停藥期 5 日。
		30-50	

2.11 乃卡巴精 Nicarbazin

化 學 名：4,4'-Dinitrocarbanilide·2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine

- 注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.11.1 雞	2.11.1.1 乃卡巴精	100-200	預防球蟲病，停藥期 5 日。
	2.11.1.2 乃卡巴精 加 衣索巴	100-200 4-8	預防球蟲病，停藥期 5 日。

2.12 歐美德普 Ormethoprim

化 學 名：2,4-Diamino-5-(6-methylveratryl)pyridine

- 注意事項：參照礦胺二甲氧嘧啶（2.15.1.1）合併使用，不可單獨使用。

2.13 沙利黴素 Salinomycin

化 學 名：Sodium salinomycin

- 注意事項：1. 本飼料添加物不可與 Tiamulin 同時使用。

2. 產蛋中之蛋雞不可使用。

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.13.1 雞(不包括肉 雞)	2.13.1.1 沙利黴素	50-70	使用至 10 週齡，預防球蟲病。
	2.13.2.1 沙利黴素	50-70	預防球蟲病。

2.14 仙杜拉素 Semduramicin

化 學 名 : Semduramicin salt sodium

注意事項：產蛋雞不可使用

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.14.1 肉雞	2.14.1.1 仙杜拉素	25	預防球蟲病。

2.15 磺胺二甲氧嘧啶 Sulfadimethoxine

化 學 名 : N (2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl) -sulfanilamide

注意事項：16 週齡以上之雞不可使用。

使用 對象	飼料添加物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.15.1 肉雞 及新 母雞	2.15.1.1 磺胺二甲氧嘧啶 加 歐美德普	125 75	預防球蟲病，停藥期 5 日。

2.16 磺胺奎林 Sulfaquinoxaline

化 學 名 : 2-Sulfanilaminoquinoxaline

注意事項：產蛋中之蛋雞不可使用。

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.16.1 雞	2.16.1.1 磺胺奎林	150-250	預防球蟲病，停藥期 10 日。

2.17 柔林 Zoalene

化 學 名 : 3,5-Dinitro-o-toluamide

注意事項：1. 產蛋中之蛋雞不可使用。

2. 應用於生長雞飼料不得超過 14 週齡。

使用 對象	飼料添加 物	用量 (ppm)	用途用法及停藥期
2.17.1 雞	2.17.1.1 柔林	40-125	預防球蟲病。

本則命令之總說明及對照表請參閱行政院公報資訊網 (<http://gazette.nat.gov.tw/>) 。