

## 附件

### 物質使用疾患診斷準則

成癮 (addiction)，包含對藥品 (drug) 或化學物質 (chemical substance) 的依賴性，在最近國際刊物「精神疾病診斷與統計手冊」第五版 (DSM-V) 中被重新定義為物質使用疾患 (substance use disorder)。物質使用疾患依其出現之臨床症狀區分為輕度 (2-3 項症狀)、中度 (4-5 項症狀)、及重度 ( $\geq 6$  項症狀)。這些症狀包括：

- 一、病人使用該藥品的劑量偏高且使用時間已超過預期。
- 二、病人有持續用藥的欲求或病人曾試圖減少用量或控制用藥但皆未成功。
- 三、病人花費大量的時間在取得及施用，或想要重獲該藥品的效果。
- 四、病人對該藥品有渴望或強烈的欲求。
- 五、病人重複使用該藥品以致無法勝任在工作上、家庭中或學校中所扮演的角色。
- 六、在即使持續的或重複的出現社交或人際問題，病人仍持續使用該藥品。
- 七、病人已放棄或減少重要的社交、職業或娛樂的活動。
- 八、即使有生理上的危險，病人仍持續使用該藥品。
- 九、即使知道該藥品會造成或惡化原有身體或精神方面的問題，病人仍然持續使用。
- 十、病人產生耐藥性 (tolerance；必須增加藥品劑量，才能達到原應有的效果)。
- 十一、病人發生戒斷症候群。

#### 註：

1. 第十及第十一項的症狀若因處方藥在正確的使用下所造成，則可不予列計。
2. 以上描述以藥品代表藥品或化學物質。

## 參考文獻

- 一、醫師為疑似有藥癮之非癌症慢性頑固性疼痛病人使用麻醉藥品之  
注意事項(行政院衛生署 95 年 9 月 29 日署授管字第 0950510395  
號函修訂)
- 二、Acute Pain Assessment and Opioid Prescribing Protocol.  
[https://www.icsi.org/\\_asset/dyp5wm/Opioids.pdf](https://www.icsi.org/_asset/dyp5wm/Opioids.pdf)
- 三、Managing Chronic Pain in Adults With or in Recovery From  
Substance Use Disorders.  
Substance Abuse and Mental Health Services Administration Center  
for Substance Abuse Treatment.  
<http://store.samhsa.gov/shin/content/SMA12-4671/TIP54.pdf>
- 四、American Society for Pain Management Nursing Position Statement:  
Pain Management in Patients with Substance Use Disorders.  
[http://www.aspmn.org/documents/PainManagementinthePatientwithSubstanceUseDisorders\\_JPN.pdf](http://www.aspmn.org/documents/PainManagementinthePatientwithSubstanceUseDisorders_JPN.pdf)
- 五、Managing Chronic Pain in Adults with or in Recovery from Substance  
Use Disorders.  
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).  
<http://store.samhsa.gov/shin/content/SMA12-4671/TIP54.pdf>
- 六、Pain and Substance Misuse: Improving the Patient Experience. The  
British Pain Society, 2007.  
[https://www.britishpainsociety.org/static/uploads/resources/misuse\\_0307\\_v13\\_FINAL.pdf](https://www.britishpainsociety.org/static/uploads/resources/misuse_0307_v13_FINAL.pdf)
- 七、Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for  
Chronic Non-Cancer Pain . Part B: Recommendations for Practice.  
[http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/opioid\\_guideline\\_part\\_b\\_v5\\_6.pdf](http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/opioid_guideline_part_b_v5_6.pdf)

- 八、 Guidelines for Prescribing Controlled Substances for Pain. Medical Board of California, 2014.  
[http://www.mbc.ca.gov/licensees/prescribing/pain\\_guidelines.pdf](http://www.mbc.ca.gov/licensees/prescribing/pain_guidelines.pdf)
- 九、 Managing Persistent Pain in Secure Settings.  
Public Health England, 2013.  
<http://www.nta.nhs.uk/uploads/persistentpain.pdf>
- 十、 A Guide for Pain Management in Low and Middle Income Communities. Managing the Risk of Opioid Abuse in Patients with Cancer Pain. Front Pharmacol. 2016; 7: Article 42.  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771925/pdf/fphar-07-00042.pdf>
- 十一、 A Startling Injustice: Pain, Opioids, and Addiction. Ann Intern Med. 2015;162: 651-652.  
<https://pdfs.semanticscholar.org/4cd9/1f37850307c88c52622641d95314de5fd040.pdf>
- 十二、 Responsible, Safe, and Effective Prescription of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain: American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP) Guidelines. Pain Physician. 2017; 20: S3-S92.  
<http://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article=NDIwMg%3D%3D&journal=103>